

辣根过氧化物酶标记兔抗山羊IgG(H+L)  
**Peroxidase Conjugated Rabbit anti-Goat IgG (H+L)**  
目录号: **RAG007**

**产品信息:**

性状: 液体。

规格: 进口分装为0.1ml。

稳定剂: 15ml/ml的牛血清白蛋白

防腐剂: 0.01% Thimerosal(水杨乙汞)

缓冲液: 0.01M 磷酸钠, 0.25M NaCL, pH 7.6

**建议使用浓度:**

免疫组化: 1:500 – 1:5,000

ELISA 或 Western Blot: 1:5,000 – 1:100,000

稀释及储存: 使用时应按所需的浓度将此溶液进行稀释, 但应注意, 应现用现配, 防止稀释的溶液中抗体及酶的活性降低。

**有效期:** 一年

**抗体特异性:** 经免疫电泳分析, 此抗体可以与山羊IgG的重链及山羊的大多数免疫球蛋白的轻链反应, 与非免疫球蛋白的血清蛋白不反应。

**注意事项:**

1、 由于NaNB<sub>3</sub>会抑制HRP的活性, 因此二抗的保存或回收应避免使用NaNB<sub>3</sub>。

2、 用户可根据需要选配我公司提供的增强型的ECL试剂盒 (Cat#:P142), 超敏型ECL试剂盒 (Cat#:U142), PVDF 膜 (Cat#: P2120), NC膜 (Cat#: P2110)。

HRP标记的二抗: 主要有羊抗鼠 (Goat anti-Mouse IgG-HRP) (Cat#: GAM007), 羊抗兔 (Goat anti-Rabbit IgG-HRP) (Cat#: GAR007), 兔抗羊 (Rabbit anti-Goat IgG-HRP) (Cat#: RAG007)。膜染色液 (Cat#: P1600, P1601), 膜再生液 (Cat#: P1650), 膜封闭液 (Cat#: P1620) 内参抗体: GAPDH (Cat#: Mab5079) Beta-Actin (Cat#: Mab1445)。预染色蛋白Marker (Cat#: PM0671)。

3、 更多的Western Blot 产品发邮件或来电咨询。

**原产地:** 美国

仅用于科研实验

**Rev.** 07/07